

Fiche technique « Hygiène respiratoire pour les professionnels en EHPAD »

Filières Gérontologiques <small>Annecy • Rumilly • Saint-Julien • Pays de Gex • Valserhône</small>	Equipe Mobile d'Hygiène Centre Hospitalier Annecy Genevois	V1 Date d'application : [xx/xx/xx] Page : 1/1
--	--	--

Port du masque

Quand ?

Dès l'apparition de symptômes ORL ou respiratoires supposés d'origine infectieuse (toux, expectoration, éternuements, mal de gorge), port systématique d'un masque chirurgical par le professionnel durant la totalité de son temps de travail



En période épidémique virale hivernale, en fonction des données épidémiologiques régionales

Comment ?

1. Réaliser une désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique avant de prendre le masque dans la boîte par les élastiques/liens
2. Positionner correctement le masque :
 - Côté coloré ou présentant l'inscription de la marque du masque ou la mention « EXT » à l'extérieur, barrette nasale en haut
 - Pincer la barrette nasale pour ajuster l'étanchéité du masque
 - **Le masque doit couvrir totalement le nez + bouche + menton**
3. Une fois positionné, ne plus le toucher
4. Le changer si mouillé ou souillé, ou a minima toutes les 4 heures
5. A jeter dès le retrait
6. Réaliser une désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique après le retrait du masque

Ne doit pas être porté en collier



Avant de prendre le masque dans la boîte



Après le retrait du masque

